



D. O. M.  
POSITIONES ANATOMICÆ  
ET  
CHIRURGICÆ.

---

EX ANATOMIA.



ENITALIUM viri fabricam quis non miratur! Si ex his sanis tot deliciae, tot bona profiliant; quot ex vitiatis dolores, quot morbi oriantur haud obscurum est. De Phimosi & Para-phimosi tantum acturi, solius Colis expositio Anatomica præmittenda videtur.

PENIS partes internæ & externæ: Hæ, cutis, cuticula, quibus Præputium & Frænulum conficiuntur; Membrana illis subjacet



cellularis nec non elastica, rigescenti coli admodum favens. Internas autem constituunt corpora cavernosa, glans, urethra, vasa, glandulae & muscoli.

CORPORA duo cavernosa, externè Syndesmofa seu ligamentosa, internè verò spongiosa, disjunctim ossibus ischii adnata, versùs pubis symphysim, cui mediante Vesalii ligamento connectuntur, ad glandem usquè conjunctim protenduntur. Ab unione, transversis amborum fibris inter se intricatis, medium observatur septum instar cribri perforatum.

URETHRAE canalis, vesicae collo contiguus, binis instruitur membranis; Inferiori corporum Cavernosorum sulco firmiter inhærens, hiat in apice Balani; à Bulbo tantùm Urethra, spongioso gaudens textù glandulis Cowperi Littrique referto, multis interius pertunditur foraminibus humorem stillantibus mucilaginosum.

GLANS sive Balanus, pars Colis extremâ, exquisitissimo sensû donatus, epidermide tenui obtectus, cellulosa Urethrae parte conflatur; humore sebaceo, ab interiori Præputii membranâ, superficies lubricatur.

ISCHIO-CAVERNOSI musculi, meritò ab Anatomicis Erectores, dùm contrahuntur, venas utrinque premendo, sanguinis refluxui obstant; quo cruore, vasis turgentibus simul ac cellulis, intenditur Mentula. Huic actioni quodque famulantur Bulbo-Cavernosi musculi. Transversos verò eorum accessores tantùm agnoscimus.

PENIS vasa pudenda, ut aiunt, externa & interna nuncupantur. Ab hypogastricis utraque; cutanea tamen à cruralibus procedunt: horum & illorum mutuam demiremur anastomosim; Genitalium hinc partium consensus intimus.

## EX CHIRURGIA.

PRÆPUTIUM æquè brevius aut longius morbis non rarè ansam præbet. Si arctiùs glandem cingat, Phimosim: si denudatam strangulet, Para-phimosim parit. Ad Chirurgum tunc citò confugere gravissimis symptomatibus tenentur ægroti.



3

**NATURALIS** & accidentalis improprie nuncupatur phimosi-  
sis: hæc à causis plerumque externis natales habet; à pravâ con-  
formatione producitur alia, ex se raro periculosa.

**GLANDIS**, aut Præputii phlogosis & intumescencia, materiæ  
sebaceæ corruptela, pruritus, dilacerationes, exulcerationes &  
calculi, has inter partes detenti, Phimosim benignam; malignam vi-  
rus cancrum aut venerea lues efficiunt.

Ex definitione innotescit Phimosi, ex causis autem & acci-  
dentibus diversa prognosis.

Si, venarum sectionibus, diætâ tenui præmissis, medicamenta su-  
perdentur emollientia cum anodinis, nonnunquam removebitur  
Phimosi. Repercutientia, ut noxia prorsus rejicimus.

**INGRAVESCENTIBUS** accidentibus, medicamentis operatio tu-  
tior; quæ ut perficiatur, alia aliis, pro Phimoseos specie, antepo-  
nenda sunt instrumenta: si scalpello tamen locus sit, idoneum magis  
herniarium à D. Lapeyronio excogitatum censetur.

**PARTIUM** quandoque cohesio solitæ officit methodo: iteratæ  
tunc sectiones adhibendæ; ita ut tamen pars utraque non lædatur.

In longiori Præputio, si angustius, quam ut scalpellus intro-  
mittatur, celebranda circumcilio.

**HÆMORRHAGIA**, si quæ sit, deligato decenter vulnere, facile  
compescitur. Apparatus, ut moris est, fenestratus imponendus:  
Sursum colis laxè revinciatur. Virus demum & accidentia suis quæ-  
que amoveantur remediis.

Quò majora sunt accidentia, eò majori arcenda celeritate: à  
symptomatibus peior Phimosi Para-phimosi, quam nonnunquam  
inducere valet depressum ad radicem Balani Præputium, si incautè  
reducatur Phimosi.

Hic Phimoseos causæ & accidentia reposcenda: Cur verò  
stranguria, inflammatio ingens & sphacelus non raro, cum tarda  
salus requiritur, Paraphimosim concomitentur, ex morbi naturâ  
liquet.



4

LEVIS & recentis Para-phimoseos curatio iisdem ac Phimoseos remediis obtinenda : quandoque tamen succedit, si colis in frigidam demittatur aquam.

HIS incassum adhibitis, ita adaugetur strangulatio ut, ni protinus hinc & illinc omnes scalpro secentur habenæ, gangrenâ mox corriperetur Mentula.

TUM in Phimosi tum in Para-phimosi, sanescente vulnere, ne cutis Balano cohærescat, linamenta medicamentis imbuta interponenda.

*Has positiones, DEO JUVANTE, & præside M. LUDOVICO-ANTONIO RAVENET, Artium & Chirurgiæ Magistro, tueri conabitur CAROLUS - TUSSANUS VERMOND, Parisinus, Artium Liberalium Magister.*

P A R I S I I S,

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

*Die Sabati 31<sup>a</sup>. Julii à sesqui-secundâ post meridiem ad septimam. Anno Domini 1751.*

P R O A C T U P U B L I C O.

---

Typis DELAGUETTE Regiæ Chirurg. Academiæ  
Typographi 1751.